

Zur vogelkundlichen Erforschungsgeschichte des Harzes (Teil 3)

Von Friedel Knolle

Bereits im Jahr 1740 erschien eine mit Abbildungen versehene Brockenmonographie in lateinischer Sprache als Sendschreiben an den in Teil 2 genannten F. E. Brückmann, verfaßt von dem Iffelder Conrektor Albert Ritter (geb. 1684). Brückmann lieferte in einem Schreiben vom 20. Januar 1740 an Ritter wichtige Zusätze. Ein Unbekannter ließ dann 1744 eine deutsche Übersetzung der Arbeit von Ritter erscheinen, vermehrt um die Schilderung einer Brockenreise. Nur diese Übersetzung hat mir bisher vorgelegen. Sie enthält auf den Seiten 74—76 eine Brockenfauna, die in mancher Hinsicht beachtenswert ist.

Von den Ringdrosseln wird bemerkt, daß sie „den Hartzern sonderlich gut schmecken“, von den Seidenschwänzen heißt es, daß diese, „wann sie häufig kommen, nach des gemeinen Mannes Meynung, theuren Kornpreiß bedeuten sollen.“ Das Birkhuhn fehlt in der Aufstellung der Brockenvögel, aber es erscheinen dort „Calecutische-Hüner“, deren Identifizierung mir einige Mühe bereitete.

Die „Synopsis“ von Leunis (1860) enthält beim Truthuhn (*Meleagris L.*) auf S. 258 die Erklärung: „... heißen fälschlich indische und calcuttische Hühner, weil das Schiff, welches die ersten Truthühner nach Europa brachte, von Amerika zuerst nach Ostindien und zwar nach Calcutta fuhr und von da erst nach Europa zurücksegelte, wo man diese Thiere zugleich für die numidischen Hühner der Alten hielt und sie deshalb mit dem Namen der Perlhühner, *Meleagris*, benannte.“ Daß Truthühner im 18. Jahrhundert im Harz bekannt waren, beweist Stübner (1790). Er schreibt auf S. 120: „Hofgänse, Hofhühner, zahme Aenten, Puter und Tauben werden in Städten und Dörfern gehalten.“

Von 1785 bis 1792 kamen in Göttingen und Nürnberg die fünf Teile von C. W. J. Gatterers, „Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen“ heraus. Im 1786 erschienenen zweiten Teil der unvollendet gebliebenen Werke, das nach des Verfassers Worten als schriftliche Vorlesung zur Vorbereitung von Harzreisen gedacht war, füllt das mit Anmerkungen versehene Verzeichnis der Harzschriften schon 98 Seiten. Sein besonderes Gewicht für die Vogelkunde aber hat der Band durch das „Verzeichnis aller wilden Thiere auf dem Harze“, aufgestellt und geordnet nach dem System des Linnaeus von dem Hofmedicus, auch Land- und Stadtphysicus zu Einbeck, Dr. Joh. Phil. Rülting (1741—1792). Das Verzeichnis enthält 762 Tierarten. Die Klasse der Vögel zählt 103 Arten, die bis auf die Baumläufer-, Gänse- und Goldhähnchenarten zu deuten sind. Ein paar Zusätze und viele der deutschen Namen stammen aus Gatterers Feder. Im Verzeichnis fehlen u. a. eine Anzahl gewöhnlicher Vogelarten, z. B. Mäusebussard, Waldkauz und Rabenkrähe. Daraus kann man schließen, daß Rülting über umfassende avifaunistische Kenntnisse wohl nicht verfügte. Er war Botaniker, und das Verzeichnis entstand, nach seinen eigenen Worten, bei „Aufsuchung der Harzpflanzen“. Sein Verzeichnis macht jedoch den Fortschritt deutlich, der in der Harzvogelkunde in den rund vier Jahrzehnten nach Brückmann erreicht wurde. Die Vögel des Tierverzeichnisses von Rülting dürfen als erste Harzavifauna angenommen werden.

Seine Vogelklasse folgt hier ohne Zusätze mit den Deutungen. In Zweifelsfällen waren dabei die wissenschaftlichen Bezeichnungen ausschlaggebend:

1. *Otis tarda*. Trappe. Trapgans. *Otis tarda*
2. *Tetrao Urogallus*. Auerhahn. *Tetrao urogallus*
3. *Tetrao Tetrix*. Birkhuhn. *Lyrurus tetrix*
4. *Tetrao Perdix*. Rephuhn. Rebhuhn. *Perdix perdix*
5. *Tetrao Coturnix*. Wachtel. Quakel. *Coturnix coturnix*
6. *Falco Chrysaetos*. Steinadler. Goldadler. *Aquila chrysaetos*
7. *Falco Milvus*. Weyhe. Milan. *Milvus milvus*
8. *Falco Haliaetus*. Endtenstoßer¹⁾. Fischahr. *Pandion haliaetus*
9. *Falco Palumbarius*. Hünerefalk. Krümmmer. Habicht. *Accipiter gentilis*
10. *Falco Nisus*. Sperber. *Accipiter nisus*
11. *Falco Tinnunculus*. Thurmfalk. *Falco tinnunculus*
12. *Strix Bubo*. Uhu. Schubuteule. *Bubo bubo*
13. *Strix Otus*. Horneule. Ohreule. *Asio otus*
14. *Strix Ulula*. Steineule. Steinkauz. Kauz. *Surnia ulula* (*Athene noctua*?)
15. *Lanius Excubitor*. Würger. Bergelster. *Lanius excubitor*
16. *Lanius Collurio*. Neuntödter. Finkenbeisser. *Lanius collurio*
17. *Corvus corax*. Kolkrahe. Rabe. *Corvus corax*
18. *Corvus Frugilegus*. Saatkrähe. Ackerkrähe. *Corvus frugilegus*
19. *Corvus cornix*. Nebelkrähe. Krähe. *Corvus cornix*
20. *Corvus monedula*. Dole. *Corvus monedula*
21. *Corvus glandarius*. Heher. *Garrulus glandarius*
22. *Corvus caryocatactes*. Tannenheher. Nußheher. *Nucifraga caryocatactes*
23. *Corvus Pica*. Elster. *Pica pica*
24. *Coracias Garrula*. Mandelkrähe. Racker. *Coracias garrulus*
25. *Oriolus Galbula*. Golddrossel. Kirschvogel. Bülau. *Oriolus oriolus*
26. *Cuculus canorus*. Kukuk. *Cuculus canorus*
27. *Jynx torquilla*. Wendehals. Drehhals. *Jynx torquilla*
28. *Picus martius*. Schwarzspecht. Holzkrähe. Holzhuhn. Krähenspecht. *Dryocopus martius*
29. *Picus viridis*. Grünspecht. Zimmermann. *Picus viridis*
30. *Picus major*. Buntspecht. *Dendrocopos major*
31. *Picus minor*. Kleiner Buntspecht. Grasspecht. *Dendrocopos minor*
32. *Sitta europaea*. Blauspecht. Grauspecht. *Sitta europaea*
33. *Alcedo Ispida*. Eisvogel. Königsfischer. *Alcedo atthis*
34. *Upupa Epops*. Wiedhopf. Kuckucksküster. *Upupa epops*
35. *Certhia familiaris*. Baumläufer. Grüper. *Certhia spec.*
36. *Certhia muraria*. Mauerspecht. Todtenvogel. *Tichodroma muraria*
37. *Columba Oenas, fera*. Wilde Taube. Holztaube. *Columba oenas*
38. *Columba Palumbus*. Ringeltaube. *Columba palumbus*
39. *Columba Turtur*. Turteltaube. *Streptopelia turtur*
40. *Alauda arvensis*. Lerche. Feldlerche. Ackerlerche. *Alauda arvensis*
41. *Alauda pratensis*. Wiesenlerche. *Anthus pratensis*
42. *Alauda campestris*. Brachlerche. Kothlerche. *Anthus campestris*
43. *Alauda cristata*. Haubenlerche. Heidelerche. *Galerida cristata*
44. *Sturnus vulgaris*. Staar. Sprehe. *Sturnus vulgaris*
45. *Sturnus cinclus*. Wasserstaar. Wasseramsel. Bachamsel. *Cinclus cinclus*
46. *Turdus viscivorus*. Misteldrossel. Schnarre. Schnarrdrossel. *Turdus viscivorus*
47. *Turdus pilaris*. Krammstvogel. *Turdus pilaris*

¹⁾ Dieser Name deutet eher auf Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) hin. Vermutlich wurden Fisch- und Seeadler nicht klar unterschieden. Schriftltg.

48. *Turdus iliacus*. Zipdrossel. Buntdrossel. *Turdus iliacus*
49. *Turdus musicus*. Singdrossel. Zippe. *Turdus philomelos*
50. *Turdus merula*. Schwarzdrossel. Amsel. *Turdus merula*
51. *Turdus torquatus*. Schilddrossel. Ringamsel. Ringdrossel. *Turdus torquatus*
52. *Turdus arundinaceus*. Rohrdrossel. Bruchdrossel. *Acrocephalus arundinaceus*
53. *Ampelis garrulus*. Seidenschwanz. Böhmer. *Bombycilla garrulus*
54. *Loxia curvirostra*. Kreuzschnabel. Krüniz. *Loxia curvirostra*
55. *Loxia coccythraustes*. Kernbeisser. Lessig. *Coccothraustes coccythraustes*
56. *Loxia Pyrrhula*. Dompfaff. Dompape. Gumpel. *Pyrrhula pyrrhula*
57. *Loxia Chloris*. Grünfink. Zwuntsche. *Carduelis chloris*
58. *Emberiza nivalis*. Schneeammer. *Plectrophenax nivalis*
59. *Emberiza hortulana* [!] Ortulan. Gartenammer. *Emberiza hortulana*
60. *Emberiza citrinella*. Goldammer. *Emberiza citrinella*
61. *Emberiza schoeniclus*. Rohrammer. Schilfvogel. Rohrsperling. *Emberiza schoeniclus*
62. *Fringilla coelebs*. Fink. Buchfink. *Fringilla coelebs*
63. *Fringilla montifringilla*. Bergfink. Quaker. Zetscher. *Fringilla montifringilla*
64. *Fringilla carduelis*. Distelfink. Stiegliz. *Carduelis carduelis*
65. *Fringilla spinus*. Zeischen. Zeising. *Carduelis spinus*
66. *Fringilla cannabina*. Hänfling. Artsche. *Carduelis cannabina*
67. *Fringilla linaria*. Flachs fink. *Carduelis flamma*
68. *Fringilla domestica*. Sperling. *Passer domesticus*
69. *Motacilla Luscinia*. Nachtigal. *Luscinia megarhynchos*
70. *Motacilla modularis*. Braune Grasmücke. Baumnachtigal. *Prunella modularis*
71. *Motacilla curruca*. Falbe Grasmücke. Heckenschmazer. *Sylvia curruca*
72. *Motacilla alba*. Weiße Bachstelz. Ackermann. Ackermännchen. *Motacilla alba*
73. *Motacilla flava*. Gelbe Bachstelz. *Motacilla flava* (*M. cinerea*?)
74. *Motacilla Erithacus*. Rothschwänzchen. *Phoenicurus ochruros*
75. *Motacilla suecica*. Blaukehlchen. *Luscinia suecica*
76. *Motacilla Rubecula*. Rothkehlchen. *Erithacus rubecula*
77. *Motacilla Phoenicurus*. Schwarzkehlchen. *Phoenicurus phoenicurus*
78. *Motacilla Troglodytes* [!] Zaunkönig. *Troglodytes troglodytes*
79. *Motacilla Regulus*. Goldhähnchen. *Regulus spec.*
80. *Parus cristatus*. Haubenmeise. *Parus cristatus*
81. *Parus major*. Kohlmeise. *Parus major*
82. *Parus caeruleus*. Blaumeise. *Parus caeruleus*
83. *Parus ater*. Plattenmeise. Sumpfmeise. *Parus ater*
84. *Parus caudatus*. Schwanzmeise. Moormeise. *Aegithalos caudatus*
85. *Hirundo rustica*. Rauchschwalbe. *Hirundo rustica*
86. *Hirundo urbica*. Hausschwalbe. *Delichon urbica*
87. *Hirundo riparia*. Uferschwalbe. *Riparia riparia*
88. *Hirundo Apus*. Mauerschwalbe. *Apus apus*
89. *Caprimulgus europaeus*. Nachtschwalbe. Tagschläffer. *Caprimulgus europaeus*
90. *Rallus Crex*. Wachtelkönig. Ralle. *Crex crex*
91. *Tringa pugnax*. Kampfhahn. Streitschnepf. Renomist. *Philomachus pugnax*
92. *Tringa vanellus*. Kybitz. *Vanellus vanellus*
93. *Scolopax rusticola*. Waldschnepfe. *Scolopax rusticola*
94. *Scolopax Gallinago*. Heerschnepfe. *Gallinago gallinago*
95. *Fulica atra*. Wasserhuhn. *Fulica atra*
96. *Ardea Grus*. Kranich. *Grus grus*
97. *Ardea Ciconia*. Storch. *Ciconia ciconia*
98. *Ardea cinerea*. Reiher. *Ardea cinerea*
99. *Ardea stellaris*. Rohrdommel. *Botaurus stellaris*
100. *Larus canus*. Graue Meve. *Larus canus*

101. *Anas Anser*, ferus. Wilde Gans. Schneegans. *Anser spec.*
 102. *Anas Boschas*, fera. Wilde Endte. *Anas platyrhynchos*
 103. *Anas Crecca*. Kriekendte. *Anas crecca*

Den Herren H.-A. Du w e n s e e und H. U l l r i c h (beide Goslar) danke ich für freundlichst gewährte Hilfe bei den Ermittlungen nach den „Calecutischen-Hünern“.

Schrifttum

B r ü c k m a n n , F. E. (1740): Epistola itineraria LXXXVI, sistens Corollarium ad relationem historico-curiosam de iterato itinere in Hercyniae montem famosissimum Bructerum ad Albert. Ritter. In: Ep. itiner. Cent. I. Wolfenbüttel. * L e u n i s , J. (1860): Synopsis der drei Naturreiche. 1. Teil. Zoologie. 2. Auflage. Hannover. * R i t t e r , A. (1740): Relatio historico-curiosa de iterato itinere in Hercyniae montem famosissimum Bructerum ad excellentissimum dom. Franc. Ern. Brückmann. Helmstedt. Supplement 1748. * D e r s . , (1744): Historische Nachricht von einer doppelten Reise nach dem auf dem Harze belegenen so berühmten Berge gemeiniglich Blocksberg genandt. Magdeburg. * R ü l i n g , J. P. (1786): Verzeichnis aller wilden Thiere auf dem Harze. In: C. W. J. G a t t e r e r , Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. 2. Teil. Göttingen. * S t ü b n e r , J. C. (1790): Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg und des demselben inkorporirten Stiftsamts Walkenried. 2. Teil, welcher die Naturgeschichte des Landes enthält. Wernigerode.