

streckten Schlammbank. Am nächsten Tag waren die 5 Stelzenläufer trotz intensiver Suche nicht mehr zu sehen.

Seit zwei Wochen herrschte mildes Maiwetter mit Temperaturen um 20 - 23 Grad, teils klar mit leichten Winden aus westlichen Richtungen.

In Niedersachsen wurden Stelzenläufer früher nur ausnahmsweise beobachtet, seit 1948 vermehrt und seit 1962 sogar fast alljährlich. Diese Entwicklung geht mit einer Zunahme und Besiedelung Südwest- und Westeuropas bis hin zu den Niederlanden einher (ZANG 1995).

So gelangen seitdem Vögel auch in zunehmendem Maß nach Nordwestdeutschland.

Literatur:

ZANG, H. (1995): Stelzenläufer - *Himantopus himantopus*. In: ZANG, H., G. GROBKOPF & H. HECKENROTH: Die Vögel Niedersachsens, Austernfischer bis Schnepfen. Naturschutz Landschaftspf. Niedersachs. B., H. 2.5.

Am Krähenfelde 7,38170 Schöppenstedt

Ornithologische Schriftenschau von Niedersachsen für das Jahr 1997

Zusammengestellt von Bernd-Olaf Flore und Jürgen Ludwig

Für Sonderdrucke und ergänzende Hinweise danken wir P.H. BECKER, A. BUCHHEIM, D.W. GROBE, A. HALLERSTEDDE, G. HILGERLOH, O. HÜPPOP, R. JÜRGENS, T. KRÜGER, M. LÜTKEPHL, T. MENKE, E. MEYBOHM, V. MORITZ, F. PLAISIER, F.U. SCHMIDT, K. THYE, U. WALTER und H. ZANG.

ALTEMÜLLER, M.J. & M. REICH (1997): Einfluß von Hochspannungsleitungen auf Brutvögel des Grünlandes. Vogel und Umwelt 9, Sonderheft: 111-127. - M.J.A., NABU-Wasservogelreservat Wallnau, 23769 Westfemarn.

AVIFAUNISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL (1997): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostel 1995 und 1996. Naturkd. Beitr. Soltau-Fallingbostel Heft 4: 37-60. - F.-U. Schmidt, Carl-Peters-Str. 42, 29614 Soltau.

BARTHEL, P.H. (1997): Bemerkenswerte Beobachtungen. November 1996 bis Januar 1997. Limicola 11: 36-48; Februar und März 1997: 89-95; April und Mai 1997: 138-152; Später Heimzug 1997: 211-216; Brutzeit bis September 1997: 256-273; Oktober/November 1997: 312-321. - Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber.

BECKER, P. (1997): Zum Rallenbestand des Naturschutzgebietes "Gronauer Masch" im Jahr 1995. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 17: 167-172. - Wilhelm-Raabe-Str. 36, 31199 Diekholzen.

BECKER, P. (1997): Vogelleben an den ehemaligen Zuckerfabriksteichen nördlich von Gronau/Leine. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 17: 173-178.

BECKER, P., G. BUSCHE, J. FOLGER & B. MÖLLER (1997) Avifaunistische Jahresberichte 1991 bis 1993. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 17: 1-147.

BECKER, P. & B. MÖLLER (1997): Beringungsbericht für die Jahre 1993 bis 1996. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 17: 149-158.

BECKER, P. H. (1997): Schadstoffmonitoring mit Seevögeln im Wattenmeer. Jber. Institut Vogelforschung 3: 32. - Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.

BECKER, P. H., A. BRENNINKMEIJER, D. FRANK, E.W.M. STIENEN & P. TODT (1997): The reproductive success of Common Terns *Sterna hirundo* as an important tool for monitoring the state of the Wadden Sea. Wadden Sea Newsletter (1): 37-41.

BECKER, P. H., D. FRANK & M. WAGENER (1997): Luxury in freshwater and stress at sea? The foraging of the Common Tern *Sterna hirundo*. Ibis 139: 264-269.

- BECKER, P. H., T. TROSCHKE, A. BEHNKE & M. WAGENER (1997): Flüge Küken der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* verhungern während Hitzeperioden. *J. Ornithol.* 138: 171-182.
- BECKER, P.H. & H. WENDELN (1997): A new application for transponders in population ecology of the Common Tern. *Condor* 99: 534-538.
- BERGMANN, M. (1997): Anwendungsmöglichkeiten des Leitartenmodells am Beispiel des Landschaftsrahmenplanes Emden und eines avifaunistischen Gutachtens zum Besonderen Schutzgebiet "Ostfriesische Meere". *Mitteilungen aus der NNA 2/97: 91-99. - M.B., regioplan, Kirchdorfer Straße 11, 26603 Aurich.*
- BRANDT, T. (1997): Das Feuchtgebiet Steinhuder Meer. *Falke* 44: 16-19. - *ÖSSM, Hagenburger Straße 6, 31547 Rehburg Loccum.*
- BUB, H. (1997): Über den Aufenthalt der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in den Nisthöhlen. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50: 19-21. - *c/o H. Oelke, Kastanienallee 13, 31224 Peine.*
- CAMPHUYSEN, C.J. & S. GARTHE (1997): An evaluation of the distribution and scavenging habits of northern fulmars (*Fulmarus glacialis*) in the North Sea. *ICES Journal of Marine Science* 54: 654-683. - *S.G., Institut für Meereskunde, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel.*
- CARNIER, T. (1997): Bleßralle (*Fulica atra*) frißt Nachschattenblätter (*Solanum dulcamara*). *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50:46. - *Haasenstr. 2, 26191 Brake.*
- CARNIER, T. (1997): Ernährung und Verhalten junger Erlenzeisige (*Carduelis spinus*) im Invasionsjahr 1993 in Nordwestniedersachsen. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50: 88-91.
- CARNIER, T. (1997): Weißstorchpaar mit fünf ausgeflogenen Jungen. *Orn. Mitt.* 49: 46.
- DERNEDE, T. (1997): Haben kleine Extensiv-Grünlandflächen für die Vogelwelt einer vielfältig genutzten, reich gegliederten Agrarlandschaft eine Bedeutung? *Corax* 17: 6-18. - *c/o Wildtierland GmbH, Redderberg 8, 27389 Fintel.*
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ (1997): Avifaunistische Beobachtungen aus dem Altbezirk Osnabrück. *Saxicola* 9. Jg. (3 Hefte). - *W. Schott, Farnbrink 43, 49191 Belm.*
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. *Limicola* 11: 153-208. - *Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber.*
- DIERK, W. (1997): Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) an den Clauener Zuckerfabrikklärteichen, Kr. Peine. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50: 73-74. - *Sackstr. 11, 31249 Hohenhameln.*
- DIERK, W. (1997): Bruten des Baumfalke (*Falco subbuteo*) auf Hochspannungsleitungen. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50: 144-145.
- DIERSCHKE, J. (1997): The status of Shorelark *Eremophila alpestris*, Twite *Carduelis flavirostris* and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis* in the Wadden Sea. *Wadden Sea Ecosystem* No. 4: 95-114. - *Gottlieb-A. Richter-Weg 5, 37077 Göttingen.*
- DIERSCHKE, V. (1997): Das Vorkommen des Sumpfläufers (*Limicola falcinellus*) in Deutschland. *Limicola* 11: 217-230. - *Gottlieb-A.-Richter Weg 5, 37077 Göttingen.*
- DIESING, P. (1997): Gelegenheitsbeobachtungen zur Nestlingsnahrung beim Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*). *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 50: 19-21. - *Lupinenstraße 29, 49661 Cloppenburg.*
- EPPLER, W. (1997): Zum Schutz der Rabenvögel. *Inform.d. Naturschutz Niedersachs.* 17: 198-214.
- EXO, K.-M. & A. GERLACH (1997): Eintrag von Bioelementen durch Silbermöwen *Larus argentatus* auf der Nordseeinsel Mellum. *Jber. Institut Vogelforschung* 3: 24. - *Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- EXO, K.-M. & B. PETERSEN (1997): Die nahrungsökologische Bedeutung *Lanice conchilega* geprägter Mischwatten für Watvögel und Möwen. *Jber. Institut Vogelforschung* 3: 23.
- EXO, K.-M. & R. TIEDEMANN (1997): Populationsgenetische Untersuchungen zur Verwandtschaft von Küsten- und Binnenlandpopulationen des Austernfischers *Haematopus ostralegus*. *Jber. Institut Vogelforschung* 3: 26.
- FENSKE, H. (1997): Brutbiologie und Bestandsentwicklung der Reiherente *Aythya fuligula* im Naturschutzgebiet Ahlhorner Fischteiche. - *Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg* 14: 111-120. - *Lerchenweg 11, 26197 Ahlhorn.*
- FOLGER, J. (1997): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen im Raum Hildesheim und im südlichen Landkreis Hannover im Jahre 1996. *Orn. Mitt.* 49: 40-41. - *Eichendorfstr. 15, 31199 Barienrode.*
- GARTHE, S. (1997): Influence of hydrography, fishing activity, and colony location on summer seabird distribution in the south-eastern North Sea. *ICES Journal of Marine Science* 54: 566-577. - *Institut für Meereskunde, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel.*
- GROBE, D. W. (1997): Zum Vorkommen der Graumammer (*Miliaria calandra*) und Niedergang des Bestandes in Süd-Niedersachsen. *Naturkundliche Berichte zur Fauna und Flora in Süd-Niedersachsen* 1997: 102-109. - *An der Lutter 31, 37075 Göttingen.*
- GRÜTZMANN J. & V. MORITZ (1997): Die Vögel der Poldergebiete östlich von Oldenburg - Teil 1: Brutvögel. *Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg* 14: 1-36. - *J.G., Schlieffenstr. 26, 26123 Oldenburg.*
- GÜNTHER, E., M. HELLMANN, M. WADEWITZ & B. NICOLAI (1997): Aktuelles zur Brutvogelwelt des Brockengebietes. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 139: 289-

298. - E.G., G.-Hauptmann-Str. 74, 38820 Halberstadt.
- GUTSMIEDEL, I. & T. TROSCHKE (1997): Untersuchungen zum Einfluß einer 110-kv-Freileitung auf eine Graureiher-Kolonie sowie auf Rastvögel. Vogel und Umwelt 9, Sonderheft: 191-209. - I.G., Hauptstr. 37, 26446 Friedeburg.
- HANDKE, K. & J. SEITZ (1997): Ein Cistensänger *Cisticola juncidis* in Norddeutschland. *Limicola* 11: 26-29. - K.H. Delmestr. 28, 27777 Ganderkesee.
- HARTWIG, E. (1997): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1996. Seevögel 18: 30-34. Verein Jordsand, Haus der Natur, Wulfsdorf, 22926 Ahrensburg.
- HECKENROTH, H. & D. LÜDERWALDT (1997): Zusammenwirken von privatem und behördlichem Naturschutz, dargestellt am Beispiel der Diepholzer Moorniederung im Landkreis Diepholz. Natur und Landschaft 72: 25-28. - H.H., Hoppegartenring 90, 30853 Langenhagen.
- HENNEBERG, H. R. (1997): Der Schloßgarten von Oldenburg und seine Vogelwelt. Beobachtungen von 1890 und heute (1997): Oldenb. Jahrb. 97: 337-356. - Ahlkenweg 45, 26131 Oldenburg.
- HILGERLOH, G. (1997): Predation by Birds on Blue Mussel *Mytilus edulis* beds of the tidal flats of Spiekeroog (southern North Sea). Mar. Ecol. Prog. Ser. 146: 61-72. - Forschungszentrum Terramare, Schleusenstraße, 26382 Wilhelmshaven.
- HILGERLOH, G., M. HERLYN & H. MICHAELIS (1997): The influence of predation by Herring Gulls (*Larus argentatus*) and Oystercatchers (*Haematopus ostralegus*) on a newly established Mussel *Mytilus edulis* bed in autumn and winter. Helgoländer Meeresunters. 51: 173-189.
- HÜPPOP, O. & K. HÜPPOP (1997): Durchzug, Häufigkeit und Wanderwege auf Helgoland beringter Vogelarten: Beispiel Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*). Jber. Institut Vogelforschung 3: 20-22. - Instf. f. Vogelforsch., Postfach 1220, 27494 Helgoland.
- JANKE, K. (1997): Sieben Jahre Insel Nigehörn: Läßt sich die Aufspülung einer Vogelschutzinsel mit den Naturschutzzielen des Nationalparks Hamburgisches Wattenmeer vereinbaren? In: "Natürliche Dynamik und Management für den Naturschutz". Schriftenr. Nationalpark Nieders. Wattenmeer 2: 49-53.
- JEBRAM, J. (1997): Verwendung avifaunistischer Daten für die Landschaftsrahmenplanung im Wolfsburger Raum. Mitteilungen aus der NNA 2/97: 79-90. - Kriegerstr. 20, 30161 Hannover.
- JÜRGENS, R. (1997): Der Kiebitz ist als Brutvogel vom Aussterben bedroht. Heimatbuch des Landkreises Wolfenbüttel 1997: 109-111. - Am Krähenfelde 7, 38170 Schöppenstedt.
- JÜRGENS, R. (1997): Junger Seeadler in Eilumer Feldflur beobachtet. Milvus (Braunschweiger Beitr. Faunistik und Naturschutz) 16: 62.
- JÜRGENS, R. (1997): Kiebitz-Bestandsaufnahmen 1997. Milvus (Braunschweiger Beitr. Faunistik und Naturschutz) 16: 54-56.
- JÜRGENS, R. (1997): Naturschutzgebiet Okeraue und Okerberge zwischen Schladen und Vienenburg. Heimatbuch des Landkreises Wolfenbüttel 1997: 112-113.
- JÜRGENS, R. (1997): Zuckerfabriksklärteiche, ein Paradies für Wat- und Wasservögel im Altenautal zwischen Bansleben und Groß Vahlberg. Milvus (Braunschweiger Beitr. Faunistik und Naturschutz) 16: 23-28.
- KACZMARECK, L. (1997): Bestandsaufnahme der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im Stadtgebiet von Hildesheim. Naturkd. Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 17: 179-183. - Julius-Leber-Grund 2, 31139 Hildesheim.
- KETZENBERG, C. & K.-M. EXO (1997): Windenergieanlagen und Raumannsprüche von Küstenvögeln. Natur und Landschaft 72: 352-357. - Instf. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.
- KOCH, B. & H.-H. BERGMANN (1997): Höhleninspektion brütender und nicht-brütender Brandenten (*Tadorna tadorna*) an der deutschen Nordseeküste mit Bemerkungen zur Bestandsermittlung. Vogelwarte 39: 82-86. - H.-H.B.: Fachbereich Biologie/Chemie der Universität, Barbarastr. 11, 49096 Osnabrück.
- KOOIKER, G. (1997): Eroberung der Siedlungen und ihrer Randgebiete durch die Elster. Ornithologen Kalender '98: 235 - 248. - Katharinenstr. 107, 49078 Osnabrück.
- KOOIKER, G. (1997): Vergleichende Siedlungsdichteuntersuchungen von Vögeln in verschiedenen Biotopen der Stadt Osnabrück. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 4-18.
- KOOIKER, G. (1997): Hohe Bläßbrallenverluste (*Fulica atra*) im kalten Winter 1995/96. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 139-143.
- KOSTRZEWA, R. & A. KOSTRZEWA (1997): Der Bruterfolg des Turmfalken *Falco tinnunculus* in Deutschland: Ergebnisse 1985-1994. J. Ornithol. 138: 73-82. - Postfach 1209, 53904 Zülpich.
- KROTT, N. & R. WASSMANN (1997): Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1997 Brutvogel in Salzgitter. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 91. - N.K., Twestje 17, 31134 Hildesheim.
- KRÜGER, T. (1997): Das Blaukehlchen *Luscinia svecica* im Oldenburger Land. Jahresber. Ornithol. Arb. gem. Oldenburg 14: 46-69. - Kornstr. 6, 26203 Wardenburg.
- KRÜGER, T. (1997): Seidenschwänze *Bombycilla garrulus* im Oldenburger Land 1995/96. Jahresber. Ornithol. Arb. gem. Oldenburg 14: 70-80.
- KRÜGER, T. & M. FEUERSENGER (1997): Ein Weibchen der Nordamerikanischen Pfeifente *Anas americana*

- na im Moorhauser Polder. - Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg 14: 121-125.
- KRÜGER, T., V. MORITZ, P. SÜDBECK, A. KEBLER, J. LANFERMANN & J. TAPHORN (1997): Avifaunistische Beobachtungen im Oldenburger Land 1993-1995. Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg 14: 126-206. - *T.K., Kornstr. 6, 26203 Wardenburg.*
- KUBETZKI, U. (1997): Ernährungsökologie von Sturmmöwen (*Larus canus*) verschiedener Kolonien Norddeutschlands. Hamburger Avifaun. Beitr. 29: 5-84. - *Institut für Meereskunde, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel.*
- LANGBEHN, H. (1997): Ein Rötelpelikan *Pelecanus rufescens* in Niedersachsen. Orn. Mitt. 49: 321-322. - *Mühlenstr. 10, 29221 Celle.*
- LIEBL, E. (1997): Brut- und Gastvögel im Ostteil des Aper Tiefs (Landkreis Ammerland). Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg 14: 37-45. - *Gaststr. 25, 26655 Westerstede.*
- LÜTKEPOHL, M. (1997): Wald-Heide-Übergänge in mitteleuropäischen Heideschutzgebieten. Natur- und Kulturlandschaft. 2: 113-117. - *M.L., Verein Naturschutzpark e.V., Wilsede 6, 29646 Bispingen.*
- LÜTKEPOHL, M. & J. PRÜTER (1997): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - ein Ausschnitt der historischen Kulturlandschaft Nordwestdeutschlands. Ornithologen Kalender '98: 177 - 187.
- MEBS, T., R. MÖCKEL, D. GRUBER & M. JÖBGES (1997): Zur aktuellen Verbreitung und Bestandssituation des Raufußkauzes (*Aegolius funereus*) in Deutschland. Vogel und Umwelt 9: 5-31. - *T.M., Schwabengrund 43, 44807 Bochum.*
- MEINECKE, H. (1997): Zur Flexibilität der Brutplatzwahl bei Greifvögeln - insbesondere des Baumfalken *Falco subbuteo*. Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg 14: 81-98. - *Vielstedter Str. 9a, 27798 Hude.*
- MELTER, J., P. SÜDBECK, D.M. FLEET, L.M. RASMUSSEN & R. VOGEL (1997): Changes in Breeding Bird Numbers on Census Areas in the Wadden Sea 1990 until 1994. Wadden Sea Ecosystem No. 4: 7-93. - *J.M., Bohmter Str. 40, 49074 Osnabrück.*
- MENKE, T. (1997): Development of the Cormorant breeding population in Germany until 1995. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 26 (IV European Conference on Cormorants): 545-550. - *Kehrwieder 6, 24143 Kiel.*
- MENNEBÄCK, T. & R. SCHOPF (1997): Die Bedeutung der Insel Memmert für die Vogelwelt. In: "Natürliche Dynamik oder Management für den Naturschutz" Schriftenr. Nationalpark Nieders. Wattenmeer 2: 44-48. - *T.M., Hallenstr. 1, 26506 Norden.*
- MEYBOHM, E. (1997): Über Bestandsbewegungen beim Weißstorch. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MR LU-LSA: 39-41. - *Kohlhofsweg 21, 27607 Langen.*
- MITSCHEKE, A., H.-H. GEIBLER, S. BAUMUNG & L. ANDRESEN (1997): Ornithologischer Jahresbericht 1994 und 1995 für das Hamburger Berichtsgebiet. Hamburger avifaun. Beitr. 28: 85-136. - *A.M., Hergartweg 11, 22559 Hamburg.*
- MÖLLER, B. (1997): Bestandsentwicklung, Bruterfolg und Sommernahrung des Sperbers (*Accipiter nisus*) nach Wiederbesiedlung des Raumes Hildesheim/Südniedersachsen von 1985 bis 1996. Naturkd. Mitt. Orn. Verein Hildesheim 17: 159-166. - *Küchenhalstr. 8, 31139 Hildesheim.*
- MORITZ, V. (1997): Wiesenweißen *Circus pygargus* in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz 1996. - Jahresber. Ornithol. Arb.gem. Oldenburg 14: 99-110. - *Feldstr. 32, 26127 Oldenburg.*
- MÜLLER, J. (1997): Wasservogel des Wesertales zwischen Höxter und Würgassen. Veröff. Naturkd. Ver. Egge-Weser 10: 1-90. - *Bezug: Naturkd. Ver. Egge-Weser, Mittelstr. 16b, 37688 Beverungen.*
- NIEMEYER, J. (1997): Erfahrungen mit dem Feuer-einsatz im Neustädter Moor. NNA-Berichte 5/97: 82-86. - *Langer Berg 15, 49419 Wagenfeld.*
- OLDEKOP, W. (1997): Massendurchzug der Weißflügelseeschwalbe. Milvus (Braunschweiger Beitr. Faunistik und Naturschutz) 16: 59-60 - *Bergiusstr. 2, 38116 Braunschweig*
- PANNACH, G. (1997): Siedlungsdichte des Buntspechtes *Dendrocopos major* 1997 im Lechlumer Holz bei Wolfenbüttel. Orn. Mitt. 97: 324-325. - *Oppelnstr. 17, 38124 Braunschweig.*
- PLAISIER, F. (1997): Langzeituntersuchung zur Auswirkung winterlicher Ölverschmutzung der Küstengewässer Langeoogs auf Seevögel. Seevögel 18: 117-122. - *Univ. Oldenburg, FB Biologie, Postfach 2503, 26111 Oldenburg.*
- PLAISIER, F. (1997): Zum Beuteerwerb der Silbermöwe (*Larus argentatus*). Orn. Mitt. 49: 97-99.
- PLAISIER, F. (1997): Zur Struktur der Avifauna einer intensiv genutzten Agrarlandschaft im Emsland. Abh. Westf. Mus. Naturk. 59 (4): 105-112.
- PLINZ, W. (1997): Beobachtungen zur Brutortstreue beim Kiebitz. Orn. Mitt. 49: 42-43. - *Willerstwierte 19, 22415 Hamburg.*
- PLUCINSKI, A. (1997): Zum Verhalten der Jungen des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius*. Orn. Mitt. 49: 255-260. - *Breslauer Str. 2, 38642 Goslar.*
- POTT, C. (1997): Fütterung nach Tidefahrplan. [Rauchschwalbenbrut auf Spiekeroog-Fähre]. Seevögel 18: 129.
- PRÜTER, J., H. HECKENROTH & M. LÜTKEPOHL (1997): Zur Situation des Birkhuhns in der Lüneburger Heide im Jahre 1996. In: Sächsische Akademie für

- Natur und Umwelt (Hrsg.): Das Birkhuhn - Die Entwicklung von Birkhuhnpopulationen im Flachland und in den Mittelgebirgen: 33-34. - *J.P., Alfred Töpfer Akademie für Natur., 29640 Schneverdingen.*
- REICHEL, B. (1997): Beobachtungen an nichtbrütenden Kolkrahen *Corvus corax* im Landkreis Soltau-Fallingb. (Niedersachsen) 1993 - 1996. Nat.kdl. Beitr. Soltau-Fallingb. Heft 4: 79-94. - *Langelohsberg 2, 29640 Schneverdingen.*
- REITHER, H. & G. REITHER (1997): Weißstorch-Beobachtungen 1997 im Vergleich mit 1996 im Regierungsbezirk Braunschweig. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 75. - *Trautener Str. 4 a, 31228 Peine.*
- RETTIG, K. (1997): Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands. 99-110. Bericht. Regelmäßige Inhalte: "Neues aus der Avifauna Ostfrieslands" sowie Zusammenstellungen von Beobachtungen aus der Region; Umfang ca. 20 Seiten. - *Danziger Str. 11, 26725 Emden.*
- REUTER, M. (1997): Großes Sterben von Zugvögeln Anfang 1996 an der ostfriesischen Küste. Seevögel 18: 60-64. - *Funkweg 4, 26056 Norden.*
- SCHRAMM, A. (1997): Konflikt zwischen Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) und Damhirsch (*Dama dama*) - zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 22-24. - *Leunisweg 11, 30599 Hannover.*
- SCHUMACHER, H. (1997): Ornithologischer Jahresbericht 1996 für die Region Göttingen. Naturkundliche Berichte zur Fauna und Flora in Süd-Niedersachsen 1997: 4-54. - *Ahornweg 1, 49170 Hagen.*
- SCHMIDT, F.-U. (1997): Die Bedeutung naturnaher Kleingärten für die heimische Vogelwelt. Mitt. NNA 8: 45-46. - *Carl-Peters-Str. 42, 29614 Soltau.*
- SCHNEIDER, U. (1997): Asseler Sand. Seevögel 18, Sonderheft: 41. - *Haus der Natur, Wulfsdorf, 22926 Ahrensburg.*
- SCHWEICHEL, R. (1997): Von Sperlingen und Krametsvögeln. Vogelschutz im Großherzogtum Oldenburg von 1869 bis 1920. Oldenb. Jahrb. 97: 159-180. - *c/o Magisterstudiengang Geschichte, Univ. Oldenburg, Sandkrugsweg 26, 26345 Bockhorn.*
- SÜDBECK, P. & B. HÄLTERLEIN (1997): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1995 - Neunte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft "Seevogelschutz". Seevögel 18: 11-19. - *P.S., Landesamt für Ökologie, Göttinger Str. 14, 30449 Hannover.*
- SUDFELDT, C. & A. BUCHHEIM (1997): Preliminary results on status and distribution of Cormorants *Phalacrocorax carbo* wintering in the western Federal States of Germany in 1994/95. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 26 (IV European Conference on Cormorants): 545-550. - *C.S., Biologische Station, Coermühle 181, 48157 Münster.*
- SUDFELDT, C., J. NAAKE, E. RUTSCHKE & J. MOOIJ (1997): Bestandssituation und -entwicklung ziehender und überwinternder Wasservögel in Deutschland. In: MITLACHER, G.: Ramsar-Bericht Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, H. 51: 89-129.
- TEMME, M. (1997): Schwarzkopf-Ruderente *Oxyurus jamaicensis* auf Norderney. Orn. Mitt. 49: 106. - *Alter Horst 18, 26548 Norderney.*
- TEMME, M. (1997): Bergente *Aythya marila* als Brutvogel auf Norderney. Orn. Mitt. 49: 106-107.
- TEMME, M. (1997): Mittelmeersteinschmätzer *Oenanthe hispanica* auf Norderney. Orn. Mitt. 49: 107.
- TEMME, M. (1997): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen auf Norderney 1996. Orn. Mitt. 49: 187-189.
- THYE, K. (1997): Avifaunistischer Sammelbericht: Brutergebnisse 1996. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 1/97: 5-8. - *Kleinburgwedeler Straße 12, 30938 Burgwedel.*
- THYE, K. (1997): Avifaunistischer Sammelbericht: Wegzug und Winter 1996/97. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 2/97: 12-19.
- THYE, K. (1997): Avifaunistischer Sammelbericht: Heimzug und Brutzeit 1997. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 3/97: 8-17.
- THYEN, S. (1997): Habitatwahl und Schlüpfertag des Rotschenkels (*Tringa totanus*) in landwirtschaftlich genutzten Salzrasen der niedersächsischen Küste. Vogelwarte 39: 117-130. - *Korsorstr. 149, 26203 Wardenburg.*
- WALTER, U. (1997): Die Bedeutung der Garnelenfischerei für die Seevögel an der Niedersächsischen Küste. Forschungszentrum Terramare Berichte Nr. 3: 1-106. - *FZ Terramare, Schleusenstraße 1, 26382 Wilhelmshaven.*
- WALTER, U. & P. H. BECKER (1997): Occurrence and consumption of seabirds scavenging on shrimp trawler discards in the North Sea. ICES Journal of Marine Science 54: 684-694. - *Inst. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- WASSMANN, R. (1997): Ökologische und ethologische Untersuchungen am Pirol (*Oriolus oriolus* L. 1758). Beitr. Naturk. Niedersachs. Sonderheft 1/1997: 1-154. - *Noldeweg 8, 38228 Salzgitter.*
- WENDELN, H. (1997): Body mass of female Common Terns (*Sterna hirundo*) during courtship: Relationships to male quality, egg mass, diet, laying date and age. Colonial Waterbirds 20: 235-243. - *Instf. f. Vogelforsch., An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven.*
- WENDELN, H. & P. H. BECKER (1997): Zusammenhänge zwischen Reproduktion, Alter und Kondition bei Flußseeschwalben. Jber. Institut Vogelforschung 3: 25.
- WENDELN, H., P. H. BECKER & M. WAGENER (1997): Beziehungen zwischen Körpermasse und Körper-

- größe bei Paarpartnern der Flußseeswalbe (*Sterna hirundo*). Vogelwarte 39: 141-148.
- WENDT, D. (1997): Zum Vorkommen des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Niedersachsen. Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Naturschutz-Report: 99-101. - *Heinrich-Spörl-Str. 7, 30880 Laatzen*.
- WENDT, D. (1997): Die Avifauna der Sohrwiesen. Hannoverscher Vogelschutzverein, Info 2/97: 5-9.
- WIEHE, H. (1997): Hat das Lokalklima Einfluß auf den Bruterfolg der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*? Orn. Mitt. 49: 264-265. - *Am Hohen Tore 2a, 38118 Braunschweig*.
- WILKENS, S. (1997): 1996 erstmals Löffler (*Platalea leucorodia*) - Brut auf der Insel Mellum (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer). Seevögel 18: 45-46. - *Bonhoefferstr. 23, 26129 Oldenburg*.
- WINKEL, W., J. BRÜN & T. LUBJUHN (1997): Untersuchungen zur Fortpflanzungsstrategie des Trauerschnäppers am Westrand seines Verbreitungsgebietes mit Hilfe des "genetischen Fingerabdrucks". Jber. Institut Vogelforschung 3: 27-28. - *W.W., Inst. f. Vogelforsch., Bauernstr. 14, 38162 Braunschweig*.
- WINKEL, W. & H. HUDDE (1997): Long-term trends in reproductive traits of tits (*Parus major*, *P. caeruleus*) and Pied Flycatchers *Ficedula hypoleuca*. J. Avian Biology 28: 187-190.
- WINKEL, W. & D. WINKEL (1997): Zum Einfluß der Populationsdichte auf die Zweitbrutrate von Tannenmeisen (*Parus ater*). Jber. Institut Vogelforschung 3: 29.
- ZANG, H. (1997): Bestandsentwicklung, Höhenverbreitung und Ansiedlungsverhalten des Trauerschnäppers *Ficedula hypoleuca* im Harz. J. Ornithol. 138: 39-49. - *Oberer Triftweg 31a, 38640 Goslar*.
- ZANG, H. (1997): Die Bestandsentwicklung einiger Brutvogelarten des Harzes in den 28 Jahren 1969-1996. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 139: 277-288.
- ZANG, H. P. KUNZE & M. WADAWITZ (1997): Die Graugans *Anser anser* in Nördlichen Harzvorland (Niedersachsen, Sachsen Anhalt). Orn. Jber. Mus. Heineanum 15: 89-95.
- ZILLICH, S. & OELKE, H. (1997): Verbreitungsanalyse von drei Neusiedlern der Göttinger Avifauna Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*), Girlitz (*Serinus serinus*), Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) Stand 1994. Beitr. Naturk. Niedersachs. 50: 53-72. - *H.O., Kastanienallee 13, 31224 Peine*.
- Nachträge 1996:**
- BÖLSCHER, B., B. HUVENDIECK & T. POHLER (1996): Habitatsprüche bodenbrütender Vogelarten in Hochmooren der Westpaläarktis. Verh. Ges. Ökologie 26: 239-246. - *B.B., TU Braunschweig, Zool. Institut, Pockelstr. 10a, 38106 Braunschweig*.
- WINKEL, W. (1996): Der Wendehals (*Jynx torquilla*) als Nisthöhlenbrüter. Befunde aus dem Braunschweiger "Höhlenbrüterprogramm" des Instituts für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland". Braunschweigische Heimat 81-82: 91-100.